

INDICE INDICADORES: (Estándar)

Condiciones estructurales

Indicador n.º 1. Atención por médico especializado	100%
Indicador n.º 2. Consulta de enfermería específica	100%

Diagnóstico y evaluación inicial

Indicador n.º 3. Demora en la derivación a atención especializada	100%
Indicador n.º 4. Diagnóstico tardío de la infección por VIH en atención especializada	25%
Indicador n.º 5. Constancia de serología VIH previa en hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	80%
Indicador n.º 6. Contenidos relevantes en la anamnesis en la valoración inicial	90%
Indicador n.º 7. Realización de serologías relevantes en la valoración inicial	95%
Indicador n.º 8. Determinación de resistencias primarias en la valoración inicial	95%
Indicador n.º 9. Carga viral plasmática del VIH y cifra de linfocitos CD4	100%
Indicador n.º 10. Valoración social inicial	90%
Indicador n.º 11. Pacientes con TAR	95%

Seguimiento e intervenciones orientadas a la prevención

Indicador n.º 12. Pacientes con seguimiento regular	90%
Indicador n.º 13. Estudio renal básico en paciente VIH	100%
Indicador n.º 14. Detección de la infección latente tuberculosa (ILT)	100%
Indicador n.º 15. Vacunación frente a la hepatitis A	85%
Indicador n.º 16. Vacunación frente a la hepatitis B	85%
Indicador n.º 17. Vacunación frente a la infección neumocócica	95%
Indicador n.º 18. Vacunación frente a papilomavirus	100%
Indicador n.º 19. Profilaxis primaria frente a <i>Pneumocystis jirovecii</i> en pacientes con < 200 linfocitos	95%
Indicador n.º 20. Tratamiento y prevención del tabaquismo	95%

Indicador n.º 21. Evaluación de la ingesta alcohólica	95%
Indicador n.º 22. Despistaje del uso de chemsex en HSH	95%
Indicador n.º 23. Cribado de consumo activo de cocaína-opiáceos	90%
Indicador n.º 24. Cribado de sífilis	85%
Indicador n.º 25. Cribado de ITS, excluyendo sífilis en población HSH	80%
Indicador n.º 26. Cribado de cáncer anal en HSH	80%
Indicador n.º 27. Tratamiento de la infección latente tuberculosa (ILT)	95%
Indicador n.º 28. Evaluación de la fragilidad en el paciente mayor de 60 años	80%
Indicador n.º 29. Conciliación terapéutica en el paciente polimedocado mayor de 60 años	90%
Indicador n.º 30. Pérdidas de seguimiento	< 5%
Indicador n.º 31. Calidad percibida por los pacientes	un estudio cada 2 años

Seguimiento de pacientes en tratamiento

Indicador n.º 32. Adecuación de las pautas iniciales de TAR a las guías españolas de tratamiento antirretroviral (GESIDA/Plan Nacional del Sida)	95%
Indicador n.º 33. Inicio del TAR tras la primera visita	90%
Indicador n.º 34. Primera visita tras instauración del TAR	90%
Indicador n.º 35. Carga viral indetectable (<50 copias/mL) en la semana 48 de tratamiento	90%
Indicador n.º 36. Tratamiento con abacavir (ABC) sin HLA-B*5701 previo	0%
Indicador n.º 37. Cambios de tratamiento durante el primer año	30%
Indicador n.º 38. Valoración de la adherencia al tratamiento	95%

Aspectos específicos en la mujer (VIH en la mujer)

Indicador n.º 39. TAR en la gestante infectada por el VIH (Indicador centinela)	100%
Indicador n.º 40. Incidencia de la transmisión vertical (Indicador centinela)	0%
Indicador n.º 41. Cribado de cáncer de cérvix	80%
Indicador n.º 42. Cribado de cáncer anal en mujeres	80%

Comorbilidades

Indicador n.º 43. Evaluación por escalas de Child y/o MELD en pacientes cirróticos	100%
--	------

Indicador n.º 44. Tratamiento específico de la hepatitis crónica por VHC	95%
Indicador n.º 45. Pacientes con HBsAg que reciben tratamiento eficaz	95%
Indicador n.º 46. Control ecográfico de la cirrosis	85%
Indicador n.º 47. Valoración del riesgo cardiovascular	90%
Indicador n.º 48. Detección de síndrome metabólico	95%

Indicador n.º 49. Evaluación de la esteatosis hepática en pacientes con síndrome metabólico 95%

Indicador n.º 50. Cálculo del IMC en la población con infección VIH 100%

Hospitalización

Indicador n.º 51. Incidencia de ingresos de pacientes en seguimiento 20 por 100 paciente-años en seguimiento

Indicador n.º 52. Incidencia de ingresos por enfermedad definitoria de SIDA <5 por 100 paciente-años en seguimiento

Indices de mortalidad

Indicador n.º 53. Mortalidad relacionada con SIDA <1 por 1000 paciente-años en seguimiento